

LITERATUR

9.1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR ALLE STÖRUNGEN DURCH PSYCHOTROPE SUBSTANZEN

- APA – American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association.
- Batra A, Hoch E, Mann K, Petersen KU (2015). S3-Leitlinie. Screening, Diagnose und Behandlung des schädlichen und abhängigen Tabakkonsums. Heidelberg: Springer.
- Dick DM, Bierut LJ (2006). The genetics of alcohol dependence. *Curr Psychiatry Rep* 8: 151–157.
- Hirschmüller A (1996). Kokain bei Morphinismus: Zur Geschichte der Suchtbehandlung im 19. Jahrhundert. In: Längle G, Mann K, Buchkremer G (Hrsg.). *Sucht – Die Lebenswelten Abhängiger*. Tübingen: Attempto.
- Heinz A, Batra A, Scherbaum N, Gouzoulis-Mayfrank E (2012). Neurobiologie der Abhängigkeit: Grundlagen und Konsequenzen für Diagnose und Therapie von Suchterkrankungen. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kalant H (1996). Current state of knowledge about the mechanisms of alcohol tolerance. *Add Biol* 1: 133–141.
- Mann K, Hoch E, Batra A (Hrsg.) (2015). S3-Leitlinien zu Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. Heidelberg: Springer.
- Schlüter-Dupont L (1990). Alkoholismus-Therapie. Pathogenetische, psychodynamische, klinische und therapeutische Grundlagen. Stuttgart, New York: Schattauer.
- Sloan CD, Sayarath V, Moore JH (2008). Systems genetics of alcoholism. *Alcohol Res Health* 31: 14–25.
- WHO – Weltgesundheitsorganisation (1993). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, Kapitel V (F). Bern, Göttingen, Toronto: Huber.
- Wolffgramm J (1996). Die Bedeutung der Grundlagenforschung für die Behandlung von Abhängigen. In: Mann K, Buchkremer G (Hrsg.). *Sucht. Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. Stuttgart, Jena, New York: G. Fischer, S. 3–18.
- 9.2 ALKOHOLBEDINGTE STÖRUNGEN**
- Anton RF, O'Malley SS, Ciraulo DA, et al. for the COMBINE Study Research Group (2006). Combined pharmacotherapies and behavioral interventions for alcohol dependence. The COMBINE study: a randomized controlled trial. *JAMA* 295: 2003–2017.
- APA – American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association Publishing.
- APA – American Psychiatric Association (2015). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5. Deutsche Ausgabe hrsg. von P. Falkai und H-U Wittchen. Göttingen, Bern, Wien: Hogrefe.
- Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG (2001). AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary health care, 2nd ed. Geneva: World Health Organization.
- Batra A, Bilke-Hentsch K (Hrsg.) (2016). *Praxisbuch Sucht. 2. A*. Stuttgart, New York: Thieme.
- Brennan JL, Leung JG, Gagliardi JP, et al. (2013). Clinical effectiveness of baclofen for the treatment of alcohol dependence: a review. *Clin Pharmacol* 5: 99–107.
- Demmel R, Scheuren B (2002). Lübecker Alkoholabhängigkeits-und-missbrauchs-Screening-Test (LAST). *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 31(2): 146–147.
- DKFZ – Deutsches Krebsforschungszentrum (2017). *Alkoholatlas Deutschland 2017*. Heidelberg: DKFZ.
- Driessen M, Veltrup C, Junghanns K, et al. (1999). Kosten-Nutzen-Analyse klinisch-evaluierter Behandlungsprogramme Erweiterte Entzugstherapie bei Alkoholabhängigkeit. *Nervenarzt* 70(5): 463–470.
- Driessen M, Meier S, Hill A, Wetterling T (2001). The course of anxiety, depression and drinking behaviours after completed detoxification in alcoholics with and without comorbid anxiety and depressive disorder. *Alcohol Alcohol* 36: 249–255.
- Ewing JA (1984). Detecting alcoholism. *JAMA* 252(14): 1905–1907.
- Farrell M, Howes S, Taylor C, et al. (1998). Substance misuse and psychiatric comorbidity: An overview of the OPCS national psychiatric morbidity survey. *Addict Behav* 23(6): 909–918.
- Feuerlein W, Ringer C, Küfner H, Antons K (1977). Diagnose des Alkoholismus: Der Münchner Alkoholismustest (MALT). *MMW* 119: 1275.
- Förg A, Hein J, Volkmar K, et al. (2012). Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a randomized placebo-controlled trial. *Alcohol Alcohol* 47(2): 149–155.
- Garbusow M, Friedel E, Sebold M, et al. (2013). Wege in die Abhängigkeit. *Sucht* 59(4): 187–199.
- Garbutt JC, Kranzler HR, O'Malley SS, et al. (2005). Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol dependence. *JAMA* 293: 1617–1625.
- Grawe K (1995). Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. *Psychotherapeut* 40: 130–145.
- Haffner HT, Becker IS, Mann K (1989). Zur Sensitivität klinisch-chemischer Marker des Alkoholismus nach kurzfristiger anlassbezogener Alkoholkarenz. *Blutalkohol* 26: 114–129.
- Heil T, Martnes D, Eyrich K (1990). Das Alkoholentzugssyndrom in der postoperativen Phase – Therapie oder Prophylaxe? *Langenbecks Arch Chir (Suppl II)*: 1137.
- Hofmann A, Kohler S (2013). Motivierende Gesprächsführung als Kurzintervention bei jungen Menschen mit auffälligem Alkoholkonsum. *Abhängigkeiten* 1/13: 85–107.
- Hunter-Reel D, Witkiewitz K, Zweben A (2012). Does session attendance by a supportive significant other predict outcomes in individual treatment for alcohol use disorders?. *Alcohol Clin Exp Res* 36(7): 1237–1243.
- Institute of Medicine (1990). *Broadening the Base of Treatment for Alcohol Problems*. Washington, DC: National Academy Press.
- Jackson R, Johnson M, Campbell F, et al. (2010). Screening and Brief Interventions for Prevention and Early Identification of alcohol use disorders in Adults and Young People. Sheffield: SCHARR.
- Jellinek EM (1960). Alcoholism: A genus and some of its species. *CMAJ* 83: 1341–1345.
- John U, Hanke M (2002). Alcohol-attributable mortality in a high per capita consumption country – Germany. *Alcohol Alcohol* 37: 581–585.
- John U, Hapke U, Rumpf HJ (2001). Serie – Alkoholismus: Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol. *Dtsch Arztebl* 98: A-2438, B-2082, C-1950.
- Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, et al. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiatry* 51: 8–19.
- Kiefer F (2002). Pharmakotherapeutische Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit. In: Mann K (Hrsg.). *Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen*. Lengerich: Pabst, S. 91–106.
- Kownacki RJ, Shadish WR (1999). Does Alcoholics Anonymous work: the results from a meta-analysis of controlled experiments. *Subst Use Misuse* 34: 1897–1916.
- Kraus L, Piontek D, Pabst A, Bühringer G (2011). Alkoholkonsum und alkoholbezogene Mortalität, Morbidität, soziale Probleme und Folgekosten in Deutschland. *Sucht* 57(2): 119–129.
- Küfner H, Feuerlein W, Flohrschütz T (1986). Die stationäre Behandlung von Alkoholabhängigen: Merkmale von Patienten und Behandlungseinrichtungen, katamnestische Ergebnisse. *Suchtgefahren* 32: 1–86.
- Landgraf M, Heinen F (2013). Fetales Alkoholsyndrom – Diagnostik. AWMF-Registernummer 022 – 025. www.leitlinien.net.
- Littleton JM, Brennan C, Bouchenafa O (1991). The role of calcium flux in the central nervous system actions of ethanol. *Ann NY Acad Sci* 625: 388–394.
- Loeber S, Kiefer F, Wagner F, et al. (2009). Behandlungserfolg nach qualifiziertem Alkoholentzug. Vergleichsstudie zum Einfluss motivationaler Interventionen. *Nervenarzt* 80: 1085–1092.
- Lutz UC, Batra A (2010). Diagnostik und Therapie des Alkoholentzugssyndroms: Fokus auf Delirium tremens und Entzugskrampfanfall. *Psychiatr Prax* 37(6): 271–278.

- Mann K (1992). Alkohol und Gehirn – Über strukturelle und funktionelle Veränderungen nach erfolgreicher Therapie. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
- Mann K, Leher P, Morgan MY (2004). The efficacy of acamprosate in the maintenance of abstinence in alcohol-dependent individuals: results of a meta-analysis. *Alcohol Clin Exp Res* 28(1): 51–63.
- Mann K, Hoch E, Batra A (2015). S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. Springer: Heidelberg.
- Marlatt GA, Gordon JA (1985). Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. New York, London: Guilford Press.
- McBride CM, Emmons KM, Lipkus IM (2003). Understanding the potential of teachable moments: the case of smoking cessation. *Health Educ Res* 18: 156–170.
- Miller WR, Rollnick S (2004). Talking oneself into change: Motivational interviewing, stages of change, and therapeutic process. *J Cogn Psychother* 18(4): 299–308.
- Miller WR, Rollnick S (2009). Motivierende Gesprächsführung. 3. A. Freiburg: Lambertus.
- Miller WR, PPL Wilbourne (2004). Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. *Addiction* 97: 265–277.
- Missel P, Bick S, Bachmeier R et al. (2013). Effektivität der stationären Sucht-rehabilitation - FVS-Katamnese des Entlassjahrgangs 2010 von Fachkliniken für Alkohol und Medikamente. *Sucht aktuell* 1: 13–25.
- NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence (2011). Alcohol-use Disorders: Diagnosis, Assessment and Management of Harmful Drinking and Alcohol Dependence (CG115). London: National Institute for Health and Clinical Excellence.
- Pabst A, Kraus L (2008). Alkoholkonsum, alkoholbezogene Störungen und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2006. *Sucht/J Addict Res Pract* 54(7): 36–46.
- Pfeiffer-Gerschel T, Künzel J, Steppan M (2011). Deutsche Suchthilfestatistik 2009. *Sucht/J Addict Res Pract* 57(6): 421–430.
- Pokorny AD, Miller BA, Kaplan HB (1972). The brief MAST: A shortened version of the Michigan Alcoholism Screening Test. *Am J Psychiatry* 129: 342–345.
- Prochaska JO, DiClemente CC (1986). Toward a comprehensive model of change. In: Miller WR, Heather N (eds.). *Treating Addictive Behaviors: Processes of Change*. New York: Plenum Press, pp. 3–27.
- Project Match Research Group (1997). Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH post-treatment drinking outcomes. *J Stud Alcohol* 58: 7–29.
- Rummel C, Lehner B, Kepp K (2017). Daten, Zahlen und Fakten. In: DHS (Hrsg.). *Jahrbuch Sucht 2017*. Lengerich: Pabst.
- Schmidt P, Köhler J, Soyka M (2008). Evidence-based treatments in the inpatient rehabilitation of alcoholics. *Fortschr Neurol Psychiatr* 76(2): 86–90.
- Schuckit MA, Hesselbrock V (1994). Alcohol dependency and anxiety disorders: What is the relationship? *Am J Psychiatry* 15: 1723–1734.
- Schwoon D (1996). Nutzung professioneller Nachsorge und Selbsthilfegruppen durch Alkoholiker nach stationärer Kurzzeittherapie. In: Mann K, Buchkremer G (Hrsg.). *Sucht. Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. Stuttgart, New York: G. Fischer, S. 281–287.
- Singer MV, Batra A, Mann K (Hrsg.) (2011). Alkohol und Tabak. Grundlagen und Folgeerkrankungen. Stuttgart, New York: Thieme.
- Soyka M (2013). Nalmefene for the treatment of alcohol dependence: a current update. *Int J Neuropsychopharmacol* 18: 1–10.
- Spies CD, Dubisz N, Funk W, et al. (1995). Prophylaxis of alcohol withdrawal syndrome in alcohol-dependent patients admitted to the intensive care unit after tumour resection. *Br J Anaesth* 75: 734–739.
- Stetter F, Mann K (1997). Zum Krankheitsverlauf Alkoholabhängiger nach einer stationären Entgiftungs- und Motivationsbehandlung. *Nervenarzt* 68: 574–581.
- Veltrup C (1993). Stationäre Motivationstherapie. *Therapiewoche* 43: 1424–1425.
- Vogelsang M (2012). Alkoholabhängigkeit: Die bagatellierte Sucht. *PID* 13(4): 33–35.
- West R (2007). The P.R.I.M.E. Theory of motivation as a possible foundation for addiction treatment. In: Henningfield J, Santora P W (eds.). *Drug Addiction Treatment in the 21st Century: Science and Policy Issues*. Baltimore: Johns Hopkins University Press; www.ucl.ac.uk/hbrc/tobacco/pubs/The%20PRIME%20theory%20of%20motivation_14_2.pdf (letzter Zugriff: 15.5.2018).
- Wienberg G (2002). Versorgungsstrukturen von Menschen mit Alkoholproblemen in Deutschland – eine Analyse aus Public-Health-Perspektive. In: Mann K (Hrsg.). *Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen*. Lengerich: Pabst, S. 17–45.

9.3 TABAKABHÄNGIGKEIT

- APA – American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association Publishing.
- Aubin HJ, Farley A, Lycett D, et al. (2012). Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. *BMJ* 345:e4439.
- Batra A (2000a). Tabakabhängigkeit – Biologische und psychosoziale Entstehungsbedingungen und Therapiemöglichkeiten. Darmstadt: Steinkopff.
- Batra A (2000b). Tabakabhängigkeit und Raucherentwöhnung bei psychiatrischen Patienten. *Fortschr Neurol Psychiatr* 68: 80–92.
- Batra A, Lindinger P, Schütz C (2004). Tabakbedingte Störungen „Leitlinie Tabakentwöhnung“. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (www.awmf.org).
- Batra A, Hoch E, Mann K, Petersen KU (2015). S3-Leitlinie. Screening, Diagnose und Behandlung des schädlichen und abhängigen Tabakkonsums. Heidelberg: Springer.
- Brecklinghaus I, Lang P, Greiser E (2004). *Rauchfrei in der Schwangerschaft. Leitfaden für die Beratung Schwangerer*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
- Brewington V, Smith M, Lipton D (1994). Acupuncture as a detoxification treatment: an analysis of controlled research. *J Subst Abuse Treat* 11(4): 289–307.
- Bundesärztekammer (2001) in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. *Frei von Tabak – Ein Stufenprogramm zur Raucherberatung und Rauchertherapie in der Arztpraxis*. 3. überarb. A. Köln: BÄK; www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Frei-Tabak3.pdf (letzter Zugriff: 15.5.2018).
- DKFZ – Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.). *Tabakatlas Deutschland 2015*. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum.
- Fagerström KO (2012). Determinants of tobacco use and renaming the FTND to the Fagerström Test for Cigarette Dependence. *Nicotine Tob Res* 14: 75–78.
- Fiore MC, Jaén CR, Baker T, et al. (2008). *Treating Tobacco Use and Dependence: Update. Clinical Practice Guideline*. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service.
- Gonzales D, Rennard SI, Nides M, et al. (2006). Varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist vs. sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial. *JAMA* 296: 47–55.
- Hughes JR, Helzer JE, Lindberg S (2006). Prevalence of DSM/ICD-defined nicotine dependence. *Drug Alcohol Depend* 85: 91–102.
- Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, et al. (2006). Efficacy of varenicline, an 2-nicotinic acetylcholine receptor partial agonist vs. placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. *JAMA* 296: 56–63.
- Leung LK, Patafio FM, Rosser WW (2011). Gastrointestinal adverse effects of varenicline at maintenance dose: a meta-analysis. *BMC Clin Pharmacol* 11: 15.
- Orth B, Töppich J (2015). *Rauchen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland 2014. Ergebnisse einer aktuellen Repräsentativbefragung und Trends*. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Köln.

- Rüther T, Bobes J, de Hert M, et al. (2014). EPA guidance on tobacco dependence and strategies for smoking cessation in people with mental illness. *Eur Psychiatry* 29(2): 65–82.
- Statistisches Bundesamt (2014). Mikrozensus – Fragen zur Gesundheit. Rauchgewohnheiten der Bevölkerung 2013. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt; www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitszustand/Rauchgewohnheiten5239004139004.pdf?__blob=publicationFile (letzter Zugriff: 21.6.2018).
- ### 9.4 DROGENBEDINGTE STÖRUNGEN
- Batra A, Meyer-Thompson HG (2017). Die Dritte Verordnung zur Änderung der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung – Was hat sich geändert? *Sucht* 63(4): 227–228.
- BÄK – Bundesärztekammer (2010). Richtlinien der Bundesärztekammer zur Durchführung der substitions-gestützten Behandlung Opiatabhängiger. *Dtsch Arztebl* 107: A511–516.
- Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (Hrsg.) (2013). Drogen und Suchtbericht Mai 2013. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit; www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Broschueren/BMG_Drogen-_und_Suchtbericht_2013_WEB_Gesamt.pdf (letzter Zugriff: 17.5.2018).
- Farrell M, Neeleman J, Gossop M, et al. (1995). Methadone provision in the European Union. *Int J Drug Pol* 6: 168–172.
- Finkbeiner T, Gastpar M (1997). Der aktuelle Stand in der Substitutionsbehandlung Drogenabhängiger. *Nervenheilkunde* 16: 215–221.
- Fridell M, Nilson M (2004). Komorbidität – Drogenkonsum und psychische Störungen. *Drogen im Blickpunkt* 14: 1–4.
- Haasen C (2007). Einführung der Diamorphinbehandlung in Deutschland: ein weiterer Weg. *Sucht* 53: 265–267.
- Haasen C, Verthein U, Degkwitz P, et al. (2007a). Heroin-assisted treatment for opioid dependence. *Br J Psychiatry* 191: 55–62.
- Haasen C, Verthein U, Degkwitz P et al. (2007b). Eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte Therapiestudie zur diamorphingestützten Behandlung Opiatabhängiger – Zielgruppenspezifische Ergebnisse. *Sucht* 53: 268–277.
- Küfner H, Denis A, Roch I, et al. (1994). Stationäre Krisenintervention bei Drogenabhängigen: Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms. Baden-Baden: Nomos.
- Kuhn S, Schu M, Vogt I et al. (2007). Die psychosoziale Behandlung im bundesdeutschen Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger. *Sucht* 53: 278–287.
- Ladewig D, Stohler R (1994). Das Opiatentzugssyndrom – Skalierungen und medikamentöse Strategien. In: Tretter F, Bussello-Spieth S, Bender W (Hrsg.). Therapie von Entzugssyndromen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, S. 145–157.
- Löbmann R (2007). Diamorphingestützte Behandlung und Kriminalität. *Sucht* 53: 288–295.
- Müller-Fahrnow W, Ilchmann U, Kühner S et al. (2002). Suchtrehabilitation in Deutschland. *DRV-Schriften* Bd. 32. Düsseldorf: Deutsche Rentenversicherung.
- Nabitz U, van den Brink W, Walburg J (2005). A quality framework for addiction treatment programmes: results of a concept mapping strategy. *Sucht* 51: 138–150.
- NIH – National Institutes of Health (1997). Effective medical treatment of opiate addiction. National Institutes of Health Consensus Statement 15(6): 1–38.
- Piontek D, Kraus L (2016). Epidemiologischer Suchtsurvey 2015. *Sucht* 62(5): 257–294.
- Raschke P (1994). Substitutionstherapie: Ergebnisse langfristiger Behandlung von Opiatabhängigen. Freiburg: Lambertus.
- Rehm J, Fischer B (2002). Von kontrollierten klinischen Studien zu einer Gestaltung des Behandlungssystems für Suchtkranke. *Sucht* 48: 310–311.
- Rehm J, van den Brink W (2007). 15 Jahre Forschung zu ärztlich verschriebenem Heroin: Wie passen die Ergebnisse des deutschen Heroinversuchs in das Puzzle der schweizerischen und niederländischen Ergebnisse? *Sucht* 53: 262–264.
- Rummel C, Budde A, Schulte L, et al. (2016). Bericht 2016 des nationalen REITOX-Knotenpunkts an die EBDD. Neue Entwicklungen und Trends. Drogensituation 2015/2016. München: Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht DBDD.
- Schuckit MA (1995). Drug and Alcohol Abuse. A Clinical Guide to Diagnosis and Treatment. New York, London: Plenum.
- Snead OC 3rd, Gibson KM (2005). Gamma-hydroxybutyric acid. *N Engl J Med* 352(26): 2721–2732.
- Stanton MD, Shadish WR (1997). Outcome, attrition, and family-couples treatment for drug abuse: a meta-analysis and review of the controlled, comparative studies. *Psychol Bull* 122: 170–191.
- Wittchen H-U, Bühringer G, Rehm J (2011). Ergebnisse und Schlussfolgerungen der PREMOS-Studie. *Suchtmed* 13(5): 287–293.
- WHO – World Health Organization (2005). International Classification of Functioning, Disability and Health; www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/ (letzter Zugriff: 21.6.2018).
- ### 9.5 MEDIKAMENTENABHÄNGIGKEIT UND MEDIKAMENTENMISSBRAUCH
- BÄK – Bundesärztekammer in Zusammenarbeit mit der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (Hrsg.) (2007). Medikamente – schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit. Leitfaden für die ärztliche Praxis. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Batra A, Thoms E (2016). Sedativa und Hypnotika. In: Batra A, Bilke-Hentsch O (Hrsg.). Praxisbuch Sucht. 2. A. Stuttgart: Thieme, S. 181–191.
- Glaeske G (2017). Medikamente 2015 – Psychotrope und andere Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.). Jahrbuch Sucht 2017. Lengerich: Pabst.
- Marschall U, L'hoest H, Radbruch L, Häuser W (2016). Long-term opioid therapy for chronic non-cancer pain in Germany. *Eur J Pain* 20(5): 767–776.
- Sakshaug S, Handal M, Hjellevik V, et al. (2017). Long-term use of Z-hypnotics and co-medication with benzodiazepines and opioids. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 120(3): 292–298.
- ### LEITLINIEN (SYSTEMATISCH, EVIDENZBASIERT)
- American Society of Addiction Medicine, Committee on Practice Guidelines, Working Group on Pharmacological Management of Alcohol Withdrawal (1997). Pharmacological management of alcohol withdrawal: a meta-analysis and evidence-based practice guideline. *JAMA* 278: 144–151.
- AWMF-S3-Leitlinie „Screening, Diagnostik und Behandlung des schädlichen und abhängigen Tabakkonsums“. AWMF-Register Nr. 076–006, www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/076-006l_S3_Tabak_2015-02.pdf (letzter Zugriff: 17.5.2018).
- Mann K, Hoch E, Batra A (2015). S3-Leitlinie. S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. Heidelberg: Springer.
- Batra A, Hoch E, Mann K, Petersen KU (2015). S3-Leitlinie. Screening, Diagnose und Behandlung des schädlichen und abhängigen Tabakkonsums. Heidelberg: Springer.
- ### PATIENTENRATGEBER
- Batra A, Buchkremer G (2017). Nichtrauchen!: Erfolgreich aussteigen in sechs Schritten. 6. A. Stuttgart: Kohlhammer.
- Elsesser K, Sartory G (2005). Ratgeber Medikamentenabhängigkeit. Informationen für Betroffene und Angehörige. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kunz H (2007). Drogen & Sucht: Ein Handbuch über alles, was Sie wissen müssen. Weinheim: Beltz.
- Lindemeyer J (2004). Ratgeber Alkoholabhängigkeit. Informationen für Betroffene und Angehörige. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scherbaum N (2014). Das Drogentaschenbuch. 5. A. Stuttgart: Thieme.
- West R, Tschöpe A (2014). Die Nichtraucher-Formel: Der revolutionäre neue Weg, um Nichtraucher zu werden und zu bleiben – Endlich frei! München: Goldmann.

SYSTEMATISCHE COCHRANE-REVIEWS (WWW.COCCHRANE.DE/DEUTSCH)

- Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M (2010). Benzodiazepines for alcohol withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD005063.
- Amato L, Minozzi S, Davoli M (2011a). Efficacy and safety of pharmacological interventions for the treatment of the alcohol withdrawal syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD008537.
- Amato L, Minozzi S, Davoli M, et al. (2011b). Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD005031.
- Amato L, Minozzi S, Davoli M, Vecchi S (2011c). Psychosocial combined with agonist maintenance treatments versus agonist maintenance treatments alone for treatment of opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 10: CD004147.
- Amato L, Davoli M, Minozzi S, et al. (2013). Methadone at tapered doses for the management of opioid withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD003409.
- Apollonio D, Philipps R, Bero L (2016). Interventions for tobacco use cessation in people in treatment for or recovery from substance use disorders. *Cochrane Database Syst Rev* 11: CD010274.
- Cahill K, Hartmann-Boyce J, Perera R (2015). Incentives for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD004307.
- Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH, et al. (2016). Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD006103.
- Carson KV, Verbiest MEA, Crone MR et al. (2012). Training health professionals in smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD000214.
- Castells X, Cunill R, Pérez-Mañá C, et al. (2016). Psychostimulant drugs for cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD007380.
- Clark N, Lintzeris N, Gijssbers A, et al. (2002). LAAM maintenance vs. methadone maintenance for heroin dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD002210.
- Coleman T, Chamberlain C, Davey MA, et al. (2015). Pharmacological interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev* 12: CD010078.
- Darker CD, Sweeney BP, Barry JM, et al. (2015). Psychosocial interventions for benzodiazepine harmful use, abuse or dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD009652.
- David SP, Lancaster T, Stead LF, et al. (2013). Opioid antagonists for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD003086.
- Day E, Ison J, Strang J (2005). Inpatient versus other settings for detoxification for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD004580.
- Day E, Bentham PW, Callaghan R, et al. (2013). Thiamine for prevention and treatment of Wernicke-Korsakoff Syndrome in people who abuse alcohol. *Cochrane Database Syst Rev* 7: CD004033.
- Dinh-Zarr T, DiGiuseppi G, Heitman E, Roberts I (2004). Interventions for preventing injuries in problem drinkers. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD001857.
- Faggiano F, Vigna-Taglianti F, Versino E, Lemma P (2003). Methadone maintenance at different dosages for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD002208.
- Ferri M, Amato L, Davoli M (2006). Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD005032.
- Ferri M, Davoli M, Perucci CA (2011). Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals. *Cochrane Database Syst Rev* 12: CD003410.
- Ferri M, Minozzi S, Bo A, Amato L (2013). Slow-release oral morphine as maintenance therapy for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD009879.
- Foxcroft DR, Coombes L, Wood S, et al. (2016). Motivational interviewing for the prevention of alcohol misuse in young adults. *Cochrane Database Syst Rev* 7: CD007025.
- Gates S, Smith LA, Foxcroft DR (2006). Auricular acupuncture for cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD005192.
- Gowing L, Ali R, White J (2010). Opioid antagonists under heavy sedation or anaesthesia for opioid withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD002022.
- Gowing L, Farrell MF, Bornemann R, et al. (2011). Oral substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection. *Cochrane Database Syst Rev* 8: CD004145.
- Gowing L, Farrell M, Ali R, White JM (2016). Alpha2-adrenergic agonists for the management of opioid withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD002024.
- Gowing L, Ali R, White J, Mbewe D (2017a). Buprenorphine for the management of opioid withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD002025.
- Gowing L, Ali R, White JM (2017b). Opioid antagonists with minimal sedation for opioid withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD002021.
- Hartmann-Boyce J, Lancaster T, Stead LF (2014). Print-based self-help interventions for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD001118.
- Hollands GJ, McDermott MS, Lindson-Hawley N, et al. (2015). Interventions to increase adherence to medications for tobacco dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD009164.
- Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J, et al. (2014). Antidepressants for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD000031.
- Indave BI, Minozzi S, Pani PP, Amato L (2016). Antipsychotic medications for cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD006306.
- Kaner EF, Dickinson HO, et al. (2007). Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD004148.
- Ker K, Chinnock P (2008). Interventions in the alcohol server setting for preventing injuries. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD005244.
- Lancaster T, LF Stead (2017). Individual behavioural counselling for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD001292.
- Lindson-Hawley N, Thompson TP, Begh R (2015). Motivational interviewing for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD006936.
- Lindson-Hawley N, Hartmann-Boyce J, Fanshawe TR, et al. (2016). Interventions to reduce harm from continued tobacco use. *Cochrane Database Syst Rev* 10: CD005231.
- Liu J, Wang LN (2017). Baclofen for alcohol withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 8: CD008502.
- Lobmaier P, Kornor H, Kunoe N, Bjørndal A (2008). Sustained-release naltrexone for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD006140.
- Lumley J, Chamberlain C, Dowswell T, et al. (2009). Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD001055.
- Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M (2009). Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD002209.
- Mattick RP, Kimber J, Breen C, Davoli M (2014). Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD002207.
- McQueen J, Howe TE, Allan L, Mains D (2011). Brief interventions for heavy alcohol users admitted to general hospital wards. *Cochrane Database Syst Rev* 8: CD005191.
- Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M (2010). Anticonvulsants for alcohol withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD005064.
- Minozzi S, Amato L, Vecchi S, et al. (2011). Oral naltrexone maintenance treatment for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 4: CD001333.
- Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M (2013). Maintenance agonist treatments for opiate dependent pregnant women. *Cochrane Database Syst Rev* 12: CD006318.
- Minozzi S, Amato L, Pani PP, et al. (2015a). Dopamine agonists for the treatment of cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD003352.

- Minozzi S, Amato L, Davoli M, et al. (2015b). Anticonvulsants for cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 4: CD006754.
- Pani PP, Trogu E, Vacca R, et al. (2010a). Disulfiram for the treatment of cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD007024.
- Pani PP, Vacca R, Trogu E, et al. (2010b). Pharmacological treatment for depression during opioid agonist treatment for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD008373.
- Pani PP, Trogu E, Vecchi S, Amato L (2011). Antidepressants for cocaine dependence and problematic cocaine use. *Cochrane Database Syst Rev* 12: CD002950.
- Pani PP, Trogu E, Maremmani I, Pacini M (2013). QTc interval screening for cardiac risk in methadone treatment of opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD008939.
- Pérez-Mañá C, Castells X, Torrens M, et al. (2013). Efficacy of psychostimulant drugs for amphetamine abuse or dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD009695.
- Perry AE, Neilson M, Martyn-St James M, et al. (2015a). Interventions for female drug-using offenders. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD010910.
- Perry AE, Neilson M, Martyn-St James M, et al. (2015b). Pharmacological interventions for drug-using offenders. *Cochrane Database Syst Rev* 6: CD010862.
- Platt L, Minozzi S, Reed J, et al. (2017). Needle syringe programmes and opioid substitution therapy for preventing hepatitis C transmission in people who inject drugs. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD012021.
- Rice VH, Hartmann-Boyce J, Stead LF (2013). Nursing interventions for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 8: CD001188.
- Rigotti NA, Clair C, Munafò MR, Stead LF (2012). Interventions for smoking cessation in hospitalised patients. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD001837.
- Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, et al. (2010a). Acamprosate for alcohol dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD004332.
- Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, et al. (2010b). Opioid antagonists for alcohol dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 12: CD001867.
- Saulle R, Vecchi S, Gowing L (2017). Supervised dosing with a long-acting opioid medication in the management of opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev* 4: CD011983.
- Shoptaw SJ, Kao U, Heinzerling K, Ling W (2009a). Treatment for amphetamine withdrawal. *Cochrane Database Syst Rev* 2: CD003021.
- Shoptaw SJ, Kao U, Ling W (2009b). Treatment for amphetamine psychosis. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD003026.
- Smedslund G, Berg RC, Hammerstrom KT, et al. (2011). Motivational interviewing for substance abuse. *Cochrane Database Syst Rev* 5: CD008063.
- Smith LA, Gates S, Foxcroft D (2006). Therapeutic communities for substance related disorder. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD005338.
- Stead LF, Perera R, Bullen C, et al. (2012). Nicotine replacement therapy for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 11: CD000146.
- Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R, Lancaster T (2013). Telephone counselling for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 8: CD002850.
- Stead LF, Koilpillai P, Lancaster T (2015). Additional behavioural support as an adjunct to pharmacotherapy for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 10: CD009670.
- Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T (2016). Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD008286.
- Stead LF, Carroll AJ, Lancaster T (2017). Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD001007.
- Taylor GMJ, Dalili MN, Semwal M, et al. (2017). Internet-based interventions for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD007078.
- Terplan M, Ramanadhan S, Locke A, et al. (2015). Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions. *Cochrane Database Syst Rev* 4: CD006037.
- Turnbull C, Osborn DA (2012). Home visits during pregnancy and after birth for women with an alcohol or drug problem. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD004456.
- van den Brand FA, Nagelhout GE, Reda AA, et al. (2017). Healthcare financing systems for increasing the use of tobacco dependence treatment. *Cochrane Database Syst Rev* 9: CD004305.
- White AR, Rampes H, Liu JP, et al. (2014). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 1: CD000009.
- Willis C, Lybrand S, Bellamy N (2004). Alcohol ignition interlock programmes for reducing drink driving recidivism. *Cochrane Database Syst Rev* 3: CD004168.
- Whittaker R, McRobbie H, Bullen C, et al. (2016). Mobile phone-based interventions for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 4: CD006611.